Quand dois-je consulter mon professionnel de la santé?

Examiner la plaie pour vérifier si elle présente des signes d'infection :

- ✓ Fièvre
- ✓ Accroissement de la douleur
- ✓ Pourtour de la plaie enflé
- ✓ Exsudat trouble ou épais et jaune
- ✓ Rougeur au-delà de la plaie
- ✓ Saignement
- ✓ Odeur inhabituelle
- ✓ Exsudat plus abondant

<u>Ou</u> si vous remarquez un des signes indiqués dans ce guide comme quoi il faut changer de pansement ou si vous avez des préoccupations à propos de la plaie ou du pansement.

Remarques

Produit offert au Canada par :
Division des produits de soins de la peau et du traitement des plaies de 3M
Compagnie 3M Canada
C.P. 5757
London (Ontario) N6A 4T1
1 800 364-3577
www.3M.ca

3M Health Care/
3M Soins de santé
2510 Conway Avenue
St. Paul, MN, É.-U., 55144

Veuillez recycler. Imprimé au Canada.
© 2012, 3M. Tous droits réservés.
3M et Tegaderm sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada.
1211-03023F

Pansement absorbant en acrylique transparent Tegaderm[MC] 3M[MC]
Guide de renseignements destiné aux patients

Pansement absorbant Tegaderm[MC]

Un progrès évident en matière de traitement des plaies

Votre professionnel de la santé a décidé de traiter votre plaie avec un **pansement absorbant en acrylique transparent Tegaderm[MC] 3M[MC]**. Le pansement fait office de couche protectrice qui favorise la cicatrisation.

Grâce au présent guide, vous connaîtrez l'efficacité normale du pansement et apprendrez quand le changer.

Fonctionnement du pansement

Le pansement absorbe l'exsudat et le retient dans une couche absorbante spéciale située en son centre. Avec le temps, une partie de l'exsudat s'évapore par le dessus du pansement, mais on ne le sent pas au toucher. Le pansement fait également office de couche protectrice qui favorise la cicatrisation.



Ce que je peux observer en portant le pansement

La compresse absorbe l'exsudat qui ne stagne alors pas sur la peau.

Le pansement peut parfois gonfler, puis redevenir plat. C'est normal.
Si le pansement ne dégonfle pas en une journée, le remplacer.

Le pansement peut apparaître craquelé, comme un miroir brisé. Cette apparence craquelée ne nuit pas à la cicatrisation. Laisser le pansement en place.

Si le pansement demeure en place et si les bords ne se sont pas retroussés, on peut prendre une douche ou un bain rapide. Ne pas prolonger le bain si on porte ce pansement.

Quand faut-il changer le pansement?

Ce pansement se porte pendant des périodes plus longues que les autres pansements que vous avez pu porter. Cas où il faut changer le pansement :

- ✓ Le pansement fuit.
- ✓ Les bords se sont retroussés jusqu'à la compresse acrylique.
- ✓ De l'exsudat est présent sous la bordure adhésive transparente (à l'extérieur de la compresse).
- ✓ La plaie est cicatrisée.
- ✓ Votre professionnel de la santé suggère d'enlever le pansement.

Voici quelques conseils qui vous aideront à déterminer s'il faut remplacer le pansement ou non.

Il est temps de changer!

Les bords se sont retroussés au-delà de la compresse. Ne pas les remettre à plat avec du ruban.

L'exsudat de la plaie déborde de la compresse en acrylique et se répand sous la bordure du pansement.

Laisser le pansement en place!

L'exsudat est visible à l'intérieur de la compresse en acrylique et les bords demeurent scellés à la peau.

La compresse en acrylique au centre du pansement peut sembler « craquelée ». C'est normal.