

3M

C. diff Solution Tablets

Comprimidos para preparar solución contra C. diff

READY-TO-USE LISTO PARA USAR

- EPA-Registered, hospital-use disinfectant cleaner.
- Use on hard, non-porous surfaces, such as floors or walls.
- Apply to pre-cleaned surface with mop, cloth, sponge, brush, wipe, foaming equipment, or coarse trigger sprayer.
- To deactivate C. diff spores, prepare a 4,306 ppm solution (refer to dilution chart). Allow surface to remain wet for 4 minutes.
- Prepare a fresh solution weekly when using closed containers (spray bottles). Prepare a fresh solution daily when using open containers (buckets) or if solution becomes diluted.
- Limpador desinfectante adecuado para uso en hospitales inscrito en la EPA.
- Uselo sobre superficies rígidas y no porosas, como paredes y pisos.
- Apliquelo sobre superficies ya limpiadas con un trapeador, paño, esponja, cepillo, toallita, equipo de espuma o un gatillo atomizador grueso.
- Para desactivar las esporas de C. diff, prepare una solución de 4306 ppm (consulte la tabla de dilución). Deje que la superficie permanezca mojada durante 4 minutos.
- Prepare una solución nueva una vez por semana y guárdela en recipientes cerrados (botellas atomizadoras). Prepare una solución nueva una vez al día cuando use recipientes abiertos (cubetas) o si la solución se diluyera.

HAZARD RATINGS/ GRADO DE PELIGRO		
HMIS	HEALTH/SALUD	NFPA
0	0	0
0	FLAMMABILITY/INFLAMABILIDAD	0
0	REACTIVITY/REACTIVIDAD	0

EPA Reg. No. 71847-6-10350
N° de Registro en la EPA: 71847-6-10350

3M

C. diff Solution Tablets

Comprimidos para preparar solución contra C. diff

READY-TO-USE LISTO PARA USAR

- EPA-Registered, hospital-use disinfectant cleaner.
- Use on hard, non-porous surfaces, such as floors or walls.
- Apply to pre-cleaned surface with mop, cloth, sponge, brush, wipe, foaming equipment, or coarse trigger sprayer.
- To deactivate C. diff spores, prepare a 4,306 ppm solution (refer to dilution chart). Allow surface to remain wet for 4 minutes.
- Prepare a fresh solution weekly when using closed containers (spray bottles). Prepare a fresh solution daily when using open containers (buckets) or if solution becomes diluted.
- Limpador desinfectante adecuado para uso en hospitales inscrito en la EPA.
- Uselo sobre superficies rígidas y no porosas, como paredes y pisos.
- Apliquelo sobre superficies ya limpiadas con un trapeador, paño, esponja, cepillo, toallita, equipo de espuma o un gatillo atomizador grueso.
- Para desactivar las esporas de C. diff, prepare una solución de 4306 ppm (consulte la tabla de dilución). Deje que la superficie permanezca mojada durante 4 minutos.
- Prepare una solución nueva una vez por semana y guárdela en recipientes cerrados (botellas atomizadoras). Prepare una solución nueva una vez al día cuando use recipientes abiertos (cubetas) o si la solución se diluyera.

HAZARD RATINGS/ GRADO DE PELIGRO		
HMIS	HEALTH/SALUD	NFPA
0	0	0
0	FLAMMABILITY/INFLAMABILIDAD	0
0	REACTIVITY/REACTIVIDAD	0

EPA Reg. No. 71847-6-10350
N° de Registro en la EPA: 71847-6-10350

Active Ingredients: Sodium dichloro-s-triazinetriene (48.21%), **Inert Ingredients** (51.79%), **Total:** (100%). Ingredient percentages represent concentrate, not the ready-to-use solution.

Dilution: This product in this container is diluted as directed on the concentrate product label. Follow directions for use on the concentrate label when applying this product.

DANGER**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.****HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS**

PRECAUTIONS: Corrosive. Causes irreversible eye damage. Harmful if swallowed, inhaled, or absorbed through the skin. Do not get in eyes, on skin, or clothing. Avoid breathing dust. Wear chemical-resistant gloves and safety glasses or face shield when making up solution. Wash thoroughly with soap and water after handling, and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco, or using the toilet. Remove and wash contaminated clothing before reuse.

REFER TO SAFETY DATA SHEET (SDS 35-9011-4). FOR MORE INFORMATION. IN CASE OF EMERGENCY, CALL: 1-800-364-3577 (1-800-3M-HELPS).

Ingredientes activos: dicloro-S-triazinatrina de sodio (48,21%), **Ingredientes inertes:** (51,79%), **Total:** (100%). Los porcentajes de ingredientes representan al concentrado, no a la solución lista para usar.

Dilución: El producto en este recipiente está diluido como se indica en la etiqueta del producto concentrado. Sigla las instrucciones de uso que figuran en la etiqueta cuando aplique este producto.

PELIGRO**MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.****RIESGOS PARA SERES HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS**

PRECAUCIONES: Corrosivo, causa daño irreversible en los ojos. Nocivo si se ingiere, inhala o se absorbe a través de la piel. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evite inhalar polvo. Use guantes resistentes a los productos químicos y gafas de seguridad, o un protector facial mientras prepara la solución. Lávese cuidadosamente con agua y jabón después de manipular el producto y antes de comer, beber, mascar chicle, fumar o usar el sanitario. Quitese la ropa contaminada y lávela antes de volverla a usar.

CONSULTE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (SDS 35-9011-4). PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN. EN CASO DE EMERGENCIA, LLAME AL: 1-800-364-3577 (1-800-3M-HELPS).

Sold and exported by/Vendido y exportado por:
3M Commercial Solutions Division
St. Paul, MN 55144-1000
Made in Ireland./Fabricado en Irlanda.
www.3M.com/facility

3M is a trademark of 3M. Used under license in Canada./3M es una marca registrada de 3M. Utilizada bajo licencia en Canadá.
© 3M 2016. All rights reserved./Todos los derechos reservados. 34-8719-6068-7

3M

C. diff Solution Tablets

Comprimidos para preparar solución contra C. diff

READY-TO-USE LISTO PARA USAR

- EPA-Registered, hospital-use disinfectant cleaner.
- Use on hard, non-porous surfaces, such as floors or walls.
- Apply to pre-cleaned surface with mop, cloth, sponge, brush, wipe, foaming equipment, or coarse trigger sprayer.
- To deactivate C. diff spores, prepare a 4,306 ppm solution (refer to dilution chart). Allow surface to remain wet for 4 minutes.
- Prepare a fresh solution weekly when using closed containers (spray bottles). Prepare a fresh solution daily when using open containers (buckets) or if solution becomes diluted.
- Limpador desinfectante adecuado para uso en hospitales inscrito en la EPA.
- Uselo sobre superficies rígidas y no porosas, como paredes y pisos.
- Apliquelo sobre superficies ya limpiadas con un trapeador, paño, esponja, cepillo, toallita, equipo de espuma o un gatillo atomizador grueso.
- Para desactivar las esporas de C. diff, prepare una solución de 4306 ppm (consulte la tabla de dilución). Deje que la superficie permanezca mojada durante 4 minutos.
- Prepare una solución nueva una vez por semana y guárdela en recipientes cerrados (botellas atomizadoras). Prepare una solución nueva una vez al día cuando use recipientes abiertos (cubetas) o si la solución se diluyera.

HAZARD RATINGS/ GRADO DE PELIGRO		
HMIS	HEALTH/SALUD	NFPA
0	0	0
0	FLAMMABILITY/INFLAMABILIDAD	0
0	REACTIVITY/REACTIVIDAD	0

EPA Reg. No. 71847-6-10350
N° de Registro en la EPA: 71847-6-10350

Active Ingredients: Sodium dichloro-s-triazinetriene (48.21%), **Inert Ingredients** (51.79%), **Total:** (100%). Ingredient percentages represent concentrate, not the ready-to-use solution.

Dilution: This product in this container is diluted as directed on the concentrate product label. Follow directions for use on the concentrate label when applying this product.

DANGER**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.****HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS**

PRECAUTIONS: Corrosive. Causes irreversible eye damage. Harmful if swallowed, inhaled, or absorbed through the skin. Do not get in eyes, on skin, or clothing. Avoid breathing dust. Wear chemical-resistant gloves and safety glasses or face shield when making up solution. Wash thoroughly with soap and water after handling, and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco, or using the toilet. Remove and wash contaminated clothing before reuse.

REFER TO SAFETY DATA SHEET (SDS 35-9011-4). FOR MORE INFORMATION. IN CASE OF EMERGENCY, CALL: 1-800-364-3577 (1-800-3M-HELPS).

Ingredientes activos: dicloro-S-triazinatrina de sodio (48,21%), **Ingredientes inertes:** (51,79%), **Total:** (100%). Los porcentajes de ingredientes representan al concentrado, no a la solución lista para usar.

Dilución: El producto en este recipiente está diluido como se indica en la etiqueta del producto concentrado. Sigla las instrucciones de uso que figuran en la etiqueta cuando aplique este producto.

PELIGRO**MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.****RIESGOS PARA SERES HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS**

PRECAUCIONES: Corrosivo, causa daño irreversible en los ojos. Nocivo si se ingiere, inhala o se absorbe a través de la piel. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evite inhalar polvo. Use guantes resistentes a los productos químicos y gafas de seguridad, o un protector facial mientras prepara la solución. Lávese cuidadosamente con agua y jabón después de manipular el producto y antes de comer, beber, mascar chicle, fumar o usar el sanitario. Quitese la ropa contaminada y lávela antes de volverla a usar.

CONSULTE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (SDS 35-9011-4). PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN. EN CASO DE EMERGENCIA, LLAME AL: 1-800-364-3577 (1-800-3M-HELPS).

Sold and exported by/Vendido y exportado por:
3M Commercial Solutions Division
St. Paul, MN 55144-1000
Made in Ireland./Fabricado en Irlanda.
www.3M.com/facility

3M is a trademark of 3M. Used under license in Canada./3M es una marca registrada de 3M. Utilizada bajo licencia en Canadá.
© 3M 2016. All rights reserved./Todos los derechos reservados. 34-8719-6068-7

3M

C. diff Solution Tablets

Comprimidos para preparar solución contra C. diff

READY-TO-USE LISTO PARA USAR

- EPA-Registered, hospital-use disinfectant cleaner.
- Use on hard, non-porous surfaces, such as floors or walls.
- Apply to pre-cleaned surface with mop, cloth, sponge, brush, wipe, foaming equipment, or coarse trigger sprayer.
- To deactivate C. diff spores, prepare a 4,306 ppm solution (refer to dilution chart). Allow surface to remain wet for 4 minutes.
- Prepare a fresh solution weekly when using closed containers (spray bottles). Prepare a fresh solution daily when using open containers (buckets) or if solution becomes diluted.
- Limpador desinfectante adecuado para uso en hospitales inscrito en la EPA.
- Uselo sobre superficies rígidas y no porosas, como paredes y pisos.
- Apliquelo sobre superficies ya limpiadas con un trapeador, paño, esponja, cepillo, toallita, equipo de espuma o un gatillo atomizador grueso.
- Para desactivar las esporas de C. diff, prepare una solución de 4306 ppm (consulte la tabla de dilución). Deje que la superficie permanezca mojada durante 4 minutos.
- Prepare una solución nueva una vez por semana y guárdela en recipientes cerrados (botellas atomizadoras). Prepare una solución nueva una vez al día cuando use recipientes abiertos (cubetas) o si la solución se diluyera.

HAZARD RATINGS/ GRADO DE PELIGRO		
HMIS	HEALTH/SALUD	NFPA
0	0	0
0	FLAMMABILITY/INFLAMABILIDAD	0
0	REACTIVITY/REACTIVIDAD	0

EPA Reg. No. 71847-6-10350
N° de Registro en la EPA: 71847-6-10350

Active Ingredients: Sodium dichloro-s-triazinetriene (48.21%), **Inert Ingredients** (51.79%), **Total:** (100%). Ingredient percentages represent concentrate, not the ready-to-use solution.

Dilution: This product in this container is diluted as directed on the concentrate product label. Follow directions for use on the concentrate label when applying this product.

DANGER**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.****HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS**

PRECAUTIONS: Corrosive. Causes irreversible eye damage. Harmful if swallowed, inhaled, or absorbed through the skin. Do not get in eyes, on skin, or clothing. Avoid breathing dust. Wear chemical-resistant gloves and safety glasses or face shield when making up solution. Wash thoroughly with soap and water after handling, and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco, or using the toilet. Remove and wash contaminated clothing before reuse.

REFER TO SAFETY DATA SHEET (SDS 35-9011-4). FOR MORE INFORMATION. IN CASE OF EMERGENCY, CALL: 1-800-364-3577 (1-800-3M-HELPS).

Ingredientes activos: dicloro-S-triazinatrina de sodio (48,21%), **Ingredientes inertes:** (51,79%), **Total:** (100%). Los porcentajes de ingredientes representan al concentrado, no a la solución lista para usar.

Dilución: El producto en este recipiente está diluido como se indica en la etiqueta del producto concentrado. Sigla las instrucciones de uso que figuran en la etiqueta cuando aplique este producto.

PELIGRO**MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.****RIESGOS PARA SERES HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS**

PRECAUCIONES: Corrosivo, causa daño irreversible en los ojos. Nocivo si se ingiere, inhala o se absorbe a través de la piel. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evite inhalar polvo. Use guantes resistentes a los productos químicos y gafas de seguridad, o un protector facial mientras prepara la solución. Lávese cuidadosamente con agua y jabón después de manipular el producto y antes de comer, beber, mascar chicle, fumar o usar el sanitario. Quitese la ropa contaminada y lávela antes de volverla a usar.

CONSULTE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (SDS 35-9011-4). PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN. EN CASO DE EMERGENCIA, LLAME AL: 1-800-364-3577 (1-800-3M-HELPS).

Sold and exported by/Vendido y exportado por:
3M Commercial Solutions Division
St. Paul, MN 55144-1000
Made in Ireland./Fabricado en Irlanda.
www.3M.com/facility

3M is a trademark of 3M. Used under license in Canada./3M es una marca registrada de 3M. Utilizada bajo licencia en Canadá.
© 3M 2016. All rights reserved./Todos los derechos reservados. 34-8719-6068-7