

Postupak za restauracije koju treba centrirati, po mogućnosti piskeranjem aluminij-oksom 40 μm; ako je keramička, ukoliko glazura do 1 mm iznad margine.

Ukoliko materijal nije to osušte zakom bez primjesa eja i vode ili pamučnih vatacama.

– Ne jekajte fosforom kiselinom jer to može oslabiti adheziju pojedinih materijala (primjerice, cirkoni, alumini-oksidi, metala).

– **Centriranje** aplikacijom materijala Single Bond Universal Adhesive. Nije potrebno koristiti dodatni primak.

Doziranje adheza

Doziranje iz bočice

Pokopk bočice za doziranje ima udubinu za poklopac. Pa ako se može otvoriti u stranu i zatvoriti jednom rukom. Poklopac će ostati otvoren ako se u stranu zatvori.

– Kako bito ispran, uzmlje bočicu u ruku, stavite palac u udubinu za palac, polsinite poklopac u stranu sve dok ne ostane u otvorenom položaju.

– Načelno se iziže napokom u okomtom položaju i iziže željenu količinu materijala. Izlazna Urvna U posudu je za doziranje. Adheziv u posudi za mješanje zaštitite od svjetlosti.

– Nakon upotrebe zatvorite bočicu priskom odgovor na poklopac. – Pričekajte 30 sekundi zatvoren, a zatim u između poklopca i bočice vidljive je ujednačena pukotina cijelim opegom.

Doziranje iz L-Pop blistera

Opze: Ne stiskajte L-Pop blister bez jednodrtnog aplikatora.

– Držite lik jednodrtnog aplikator jednom rukom, prekrivajući otvor blistera svojim palcem. Tako ćete sprječiti zatezanje tekućine za jetkanje.

– **Palcem i kažiprstom drugu ruku pritisnite spremnik L-Pop blistera potpuno u vanjsku stranu i odložite poklopac.**

– **Okrećite jednodrtni aplikator naprijed, natrag u tekucinu da ga prekrinete u cijelosti.**

– Za jednostavnu aplikaciju u kavlet, jednodrtni aplikator može se saviti još u još u L-Pop blistera. Jednodrtni aplikator može se saviti još u još u L-Pop blistera. Jednodrtni aplikator može se saviti još u još u L-Pop blistera. Jednodrtni aplikator može se saviti još u još u L-Pop blistera.

– **Jednodrtni aplikator** može prijevremeno polimerizirati ako se izloži prirodnoj ili umjetnoj svjetlosti. Izbjegavajte izloženje izravne svjetlosti tijekom aplikacije.

– **Tijekom tretmana**, palcem i kažiprstom isitnite svu tekućinu u otvoreni udubini. Nije bitno izostiti vidljivi aplikator.

Doziranje aktivator

– **Uvjetne** aktivatorne bočice.

– Izmiješajte željenu količinu materijala Single Bond Universal DCA u omjeru 1:1 (kap i s materijalom Single Bond Universal u posudi za mješanje 5 sekundi). Izvršno zatvorite aplikator. Tekućinu u posudi za mješanje zaštitite od svjetlosti.

– **Pažljivo i igravo** zatvorite bočicu nakon doziranja. Ako je potrebno dezinficirajte bočicu u skladu s lokalom regulativom.

Aplikacija

– Izbjegavajte kontaminaciju krvlju, slinom ili slusnom tekućinom tijekom aplikacije. Preporučuje se nositi zaštitnu masku i naočale.

– **Osigurajte da je** tretirano područje dovoljno suho i da sprječite izlaganje mekih tkiva.

Postupak za zavrane restauracije sa svjetlosno-polimerizirajućim kompozitima i kompenzira, intraronealne popravke koristeći svjetlosno-polimerizirajuće kompozite, desenzibilizirajuće kompozite, desenzibilizirajuće zubnog korijena, pečavene kaviteta prije uspa ignamam, pečavene kaviteta i preparaciju bitakcija prije privremeno postavljanja indirektnih restauracija

– Jednodrtni aplikator za aplikaciju adheziva na čitavu strukturu zuba to **urijavljaje** tijekom 20 sekundi. Izbjegavajte doticaj adheziva i sluznice zuba.

– **Po potrebi**, tijekom tretmana ponovno ovlisajte jednodrtni aplikator. – **Ukoliko zamjetite** vidljive tragove tekućine, u sekundi sve dok se ne prestane gubiti te dok odapaku u potpunosti ne ishlapi.

– **Strvrdnite adheziv** tijekom 10 sekundi svjetlikom koju islate koristite.

– **Kako je prikladno za pojedini indikacij**, nastavite sa željenim materijalom nakon što se osušte materijal u potpunosti.

Postupak za otvorena struktura i struktura sa srednjim-nivajnim kompozitima te materijalima i cementima za nadogradnju strukture zuba
Prilikom upotrebe materijala RelyX Ultimate, aktivator nije potreban, jer je već integriran u cement.
Molimo da pratite upute za upotrebu materijala RelyX Ultimate.

– **Uvjetne** po jednu kapu materijala Single Bond Universal i Single Bond Universal DCA u posudu za mješanje te miješajte tijekom 5 sekundi.

– **Jednodrtnim aplikatorom** aplicirajte mješavinu na čitavu strukturu zuba i **urijavljaje** tijekom 20 sekundi. Izbjegavajte doticaj adheziva i sluznice zuba.

– **Ukoliko zamjetite** vidljive tragove tekućine, u sekundi sve dok se ne prestane gubiti te dok odapaku u potpunosti ne ishlapi.

– **Kako je prikladno za pojedini indikacij**, nastavite sa željenim materijalom nakon što se osušte materijal u potpunosti.

Postupak za otvorena struktura i struktura sa srednjim-nivajnim kompozitima te materijalima i cementima za nadogradnju strukture zuba
Prilikom upotrebe materijala RelyX Ultimate, aktivator nije potreban, jer je već integriran u cement.
Molimo slijediti upute za upotrebu materijala RelyX Ultimate.

– **Uvjetne** po jednu kapu materijala Single Bond Universal i Single Bond Universal DCA u posudu za mješanje te miješajte tijekom 5 sekundi.

– **Jednodrtnim aplikatorom** aplicirajte mješavinu na čitavu strukturu zuba i **urijavljaje** tijekom 20 sekundi. Izbjegavajte doticaj adheziva i sluznice zuba.

– **Ukoliko zamjetite** vidljive tragove tekućine, u sekundi sve dok se ne prestane gubiti te dok odapaku u potpunosti ne ishlapi.

– **Kako je prikladno za pojedini indikacij**, nastavite sa željenim materijalom nakon što se osušte materijal u potpunosti.

TEMA GYAR

– **Uvjetne** po jednu kapu materijala Single Bond Universal i Single Bond Universal DCA u posudu za mješanje te miješajte tijekom 5 sekundi.

– **Jednodrtnim aplikatorom** aplicirajte mješavinu na čitavu strukturu zuba i **urijavljaje** tijekom 20 sekundi. Izbjegavajte doticaj adheziva i sluznice zuba.

– **Ukoliko zamjetite** vidljive tragove tekućine, u sekundi sve dok se ne prestane gubiti te dok odapaku u potpunosti ne ishlapi.

– **Kako je prikladno za pojedini indikacij**, nastavite sa željenim materijalom nakon što se osušte materijal u potpunosti.

Postupak centriranja indirektnih restauracija i fusaka koristeći materijal RelyX Ultimate Adhesive Resin Cement

– **Prilikom upotrebe materijala Single Bond Universal DCA nije potreban**, Molimo da pratite upute za upotrebu materijala RelyX Ultimate.

Upotreba materijala Single Bond Universal kao primera za indirektno restauracija

Prilikom upotrebe materijala RelyX Ultimate, Single Bond Universal nije potreban, Molimo da pratite upute za upotrebu materijala RelyX Ultimate.

– **Pripremite površinu restauracije**.

– **Jekajte** stakleno-ionomernu površine hidroforomom kiselinom u skladu s uputama za upotrebu proizvoda.

– **Centriranje** aplikacijom keramičkih keramičkih vatacama, po mogućnosti piskeranjem.

– **Ne jekajte** fosforom kiselinom jer to može oslabiti adheziju na određene materijale (primjerice, cirkoni, alumini-oksidi, metala).

– **Centriranje** aplikacijom materijala Single Bond Universal Adhesive. Nije potrebno koristiti dodatni primak.

– **Uklonite** aplikator u skladu s lokomnim regulativom.

– **Uklonite** aplikator u skladu s lokomnim regulativom.

– **Uklonite** aplikator u skladu s lokomnim regulativom.

– **Uklonite** aplikator u skladu s lokomnim regulativom.

– **Uklonite** aplikator u skladu s lokomnim regulativom.

– **Uklonite** aplikator u skladu s lokomnim regulativom.

– **Uklonite** aplikator u skladu s lokomnim regulativom.

– **Uklonite** aplikator u skladu s lokomnim regulativom.

– **Uklonite** aplikator u skladu s lokomnim regulativom.

– **Uklonite** aplikator u skladu s lokomnim regulativom.

– **Uklonite** aplikator u skladu s lokomnim regulativom.

– **Uklonite** aplikator u skladu s lokomnim regulativom.

– **Uklonite** aplikator u skladu s lokomnim regulativom.

– **Uklonite** aplikator u skladu s lokomnim regulativom.

– **Uklonite** aplikator u skladu s lokomnim regulativom.

– **Uklonite** aplikator u skladu s lokomnim regulativom.

– **Uklonite** aplikator u skladu s lokomnim regulativom.

– **Uklonite** aplikator u skladu s lokomnim regulativom.

– **Uklonite** aplikator u skladu s lokomnim regulativom.

– **Uklonite** aplikator u skladu s lokomnim regulativom.

– **Uklonite** aplikator u skladu s lokomnim regulativom.

– **Uklonite** aplikator u skladu s lokomnim regulativom.

– **Uklonite** aplikator u skladu s lokomnim regulativom.

– **Uklonite** aplikator u skladu s lokomnim regulativom.

– **Uklonite** aplikator u skladu s lokomnim regulativom.

– **Uklonite** aplikator u skladu s lokomnim regulativom.

– **Uklonite** aplikator u skladu s lokomnim regulativom.

– **Uklonite** aplikator u skladu s lokomnim regulativom.

– **Uklonite** aplikator u skladu s lokomnim regulativom.

Preparaci

Ureg-gyokpreparaci

– **Ureg-gyokpreparaci** reszet vi spray-vel tavoltsa el és a gyokert, vagy uregét víz, és oldsmenettel 2-3 intervallumban kissek szilitsza meg, hogy a szilitsza hatos.

– **Az ureget** egyenként csnyira szilitsza meg, hogy annak fellete selyem-matkn tuljon. A tulvoz szilitsza posztoperativ erzkensyeghez vezethet.

A kórkód-dolgozat kivara a lezato szilitsza után az olyan anyagok alkalmazását követően, amelyek nem tartoznak az adhezív, desenzibilizáló, dentin lezárók, EDTA által oldotk, hidrogén-peroxid, stb. nem javított. Ezen anyagok maradványai befolyásolják a restaurációs tapadószerkezetek és keményedési reakcióit, különösen kettős-, vagy önkeményedő anyagok esetében.

Kezeltem fogzomanc

– **A szilitsza** minden szilitsza meg a fogzománkot (pl. polirozó krmével, vagy porfúval)és, és adhezion szilitsza meg víz spray-vel.

– **Ezt követően** massza és oldószer, szeliktiv zománrtaró szakszaggal.

– **Majd folytona** a Single Bond Universal ragasztóanyag alkalmazását.

A fog anyagának marataisa (opcionális)

– **A ragasztóanyag** felvitelének előtt, hogy klinikailag megfelelő rögzítési állapotot jónál érte. A szeliktiv zománrtarással, vagy a „Jota-Etch”-eljárással még jobb tapadási értéket érthet el.

Szeliktiv zománrtarás

– **A szeliktiv zománrtarás** nem befolyásolja adheziót és tapadást.

– **Kereskedelmi forgalomban** kapható kb. 35%-os foszforos-marogélt pl. Scotchbond Universal Etchant terméket vigye fel a preparált és nem preparált foganyagra. (Kérmás és dentin) és hagyja, hogy kb. 15 másodpercig kifejtse hatását.

– **Ezt követően** alaposan öblitse le vízzel és víz, és oldsmenettel levegővel, vagy pamut tampon használtával szilitsza meg, és ne szárítsa túl.

– **A kettővel** lezáró anyagot a veneer-preparáció.

– **Kereskedelmi forgalomban** kapható kb. 35%-os foszforos-marogélt pl. Scotchbond Universal Etchant terméket vigye fel a preparált és nem preparált foganyagra. (Kérmás és dentin) és hagyja, hogy kb. 15 másodpercig kifejtse hatását.

– **Ezt követően** alaposan öblitse le vízzel a krmét a fogról és oldsmenettel levegővel, vagy pamut tampon használtával szilitsza meg, és ne szárítsa túl.

– **A kettővel** lezáró anyagot a veneer-preparáció.

– **Kereskedelmi forgalomban** kapható kb. 35%-os foszforos-marogélt pl. Scotchbond Universal Etchant terméket vigye fel a preparált és nem preparált foganyagra. (Kérmás és dentin) és hagyja, hogy kb. 15 másodpercig kifejtse hatását.

– **Ezt követően** alaposan öblitse le vízzel és víz, és oldsmenettel levegővel, vagy pamut tampon használtával szilitsza meg, és ne szárítsa túl.

Fognyak deszenzibilizálása

– **A szilitsza** minden szilitsza meg a fognyakát (pl. polirozó krmével, vagy porfúval)és, és adhezion szilitsza meg víz spray-vel.

– **Alaposan öblitse** le vízzel és víz, és oldsmenettel levegővel, vagy pamut tampon használtával szilitsza meg, és ne szárítsa túl.

– **Majd folytona** a Single Bond Universal ragasztóanyag alkalmazását.

Tömések vagy restaurációk előkészítése javítások

– **A szilitsza** minden szilitsza meg a fognyakát (pl. polirozó krmével, vagy porfúval)és, és adhezion szilitsza meg víz spray-vel.

– **A restauráció** ragasztóoldat felvitelét alaposan csiszolja fel, legjobb a 40 μm alumínium oxidúval való kezelés, kerámia esetén a perem felét 1 mm-es magasságban távolítsa el.

– **Alaposan öblitse** le vízzel és víz, és oldsmenettel levegővel, vagy pamut tampon használtával szilitsza meg, és ne szárítsa túl.

– **A kettővel** lezáró anyagot a veneer-preparáció.

– **Kereskedelmi forgalomban** kapható kb. 35%-os foszforos-marogélt pl. Scotchbond Universal Etchant terméket vigye fel a preparált és nem preparált foganyagra. (Kérmás és dentin) és hagyja, hogy kb. 15 másodpercig kifejtse hatását.

– **Ezt követően** alaposan öblitse le vízzel és víz, és oldsmenettel levegővel, vagy pamut tampon használtával szilitsza meg, és ne szárítsa túl.

– **A kettővel** lezáró anyagot a veneer-preparáció.

– **Kereskedelmi forgalomban** kapható kb. 35%-os foszforos-marogélt pl. Scotchbond Universal Etchant terméket vigye fel a preparált és nem preparált foganyagra. (Kérmás és dentin) és hagyja, hogy kb. 15 másodpercig kifejtse hatását.

– **Ezt követően** alaposan öblitse le vízzel és víz, és oldsmenettel levegővel, vagy pamut tampon használtával szilitsza meg, és ne szárítsa túl.

– **A kettővel** lezáró anyagot a veneer-preparáció.

– **Kereskedelmi forgalomban** kapható kb. 35%-os foszforos-marogélt pl. Scotchbond Universal Etchant terméket vigye fel a preparált és nem preparált foganyagra. (Kérmás és dentin) és hagyja, hogy kb. 15 másodpercig kifejtse hatását.

– **Ezt követően** alaposan öblitse le vízzel és víz, és oldsmenettel levegővel, vagy pamut tampon használtával szilitsza meg, és ne szárítsa túl.

– **A kettővel** lezáró anyagot a veneer-preparáció.

– **Kereskedelmi forgalomban** kapható kb. 35%-os foszforos-marogélt pl. Scotchbond Universal Etchant terméket vigye fel a preparált és nem preparált foganyagra. (Kérmás és dentin) és hagyja, hogy kb. 15 másodpercig kifejtse hatását.

– **Ezt követően** alaposan öblitse le vízzel és víz, és oldsmenettel levegővel, vagy pamut tampon használtával szilitsza meg, és ne szárítsa túl.

– **A kettővel** lezáró anyagot a veneer-preparáció.

– **Kereskedelmi forgalomban** kapható kb. 35%-os foszforos-marogélt pl. Scotchbond Universal Etchant terméket vigye fel a preparált és nem preparált foganyagra. (Kérmás és dentin) és hagyja, hogy kb. 15 másodpercig kifejtse hatását.

– **Ezt követően** alaposan öblitse le vízzel és víz, és oldsmenettel levegővel, vagy pamut tampon használtával szilitsza meg, és ne szárítsa túl.

– **A kettővel** lezáró anyagot a veneer-preparáció.

– **Kereskedelmi forgalomban** kapható kb. 35%-os foszforos-marogélt pl. Scotchbond Universal Etchant terméket vigye fel a preparált és nem preparált foganyagra. (Kérmás és dentin) és hagyja, hogy kb. 15 másodpercig kifejtse hatását.

– **Ezt követően** alaposan öblitse le vízzel és víz, és oldsmenettel levegővel, vagy pamut tampon használtával szilitsza meg, és ne szárítsa túl.

– **A kettővel** lezáró anyagot a veneer-preparáció.

– **Kereskedelmi forgalomban** kapható kb. 35%-os foszforos-marogélt pl. Scotchbond Universal Etchant terméket vigye fel a preparált és nem preparált foganyagra. (Kérmás és dentin) és hagyja, hogy kb. 15 másodpercig kifejtse hatását.

– **Ezt követően** alaposan öblitse le vízzel és víz, és oldsmenettel levegővel, vagy pamut tampon használtával szilitsza meg, és ne szárítsa túl.

– **A kettővel** lezáró anyagot a veneer-preparáció.

– **Kereskedelmi forgalomban** kapható kb. 35%-os foszforos-marogélt pl. Scotchbond Universal Etchant terméket vigye fel a preparált és nem preparált foganyagra. (Kérmás és dentin) és hagyja, hogy kb. 15 másodpercig kifejtse hatását.

– **Ezt követően** alaposan öblitse le vízzel és víz, és oldsmenettel levegővel, vagy pamut tampon használtával szilitsza meg, és ne szárítsa túl.

– **A kettővel** lezáró anyagot a veneer-preparáció.

– **Kereskedelmi forgalomban** kapható kb. 35%-os foszforos-marogélt pl. Scotchbond Universal Etchant terméket vigye fel a preparált és nem preparált foganyagra. (Kérmás és dentin) és hagyja, hogy kb. 15 másodpercig kifejtse hatását.

– **Ezt követően** alaposan öblitse le vízzel és víz, és oldsmenettel levegővel, vagy pamut tampon használtával szilitsza meg, és ne szárítsa túl.

– **A kettővel** lezáró anyagot a veneer-preparáció.

– **Kereskedelmi forgalomban** kapható kb. 35%-os foszforos-marogélt pl. Scotchbond Universal Etchant terméket vigye fel a preparált és nem preparált foganyagra. (Kérmás és dentin) és hagyja, hogy kb. 15 másodpercig kifejtse hatását.

– **Ezt követően** alaposan öblitse le vízzel és víz, és oldsmenettel levegővel, vagy pamut tampon használtával szilitsza meg, és ne szárítsa túl.

– **A kettővel** lezáró anyagot a veneer-preparáció.

– **Kereskedelmi forgalomban** kapható kb. 35%-os foszforos-marogélt pl. Scotchbond Universal Etchant terméket vigye fel a preparált és nem preparált foganyagra. (Kérmás és dentin) és hagyja, hogy kb. 15 másodpercig kifejtse hatását.

– **Ezt követően** alaposan öblitse le vízzel és víz, és oldsmenettel levegővel, vagy pamut tampon használtával szilitsza meg, és ne szárítsa túl.

– **A kettővel** lezáró anyagot a veneer-preparáció.

– **Kereskedelmi forgalomban** kapható kb. 35%-os foszforos-marogélt pl. Scotchbond Universal Etchant terméket vigye fel a preparált és nem preparált foganyagra. (Kérmás és dentin) és hagyja, hogy kb. 15 másodpercig kifejtse hatását.

– **Ezt követően** alaposan öblitse le vízzel és víz, és oldsmenettel levegővel, vagy pamut tampon használtával szilitsza meg, és ne szárítsa túl.

– **A kettővel** lezáró anyagot a veneer-preparáció.

– **Kereskedelmi forgalomban** kapható kb. 35%-os foszforos-marogélt pl. Scotchbond Universal Etchant terméket vigye fel a preparált és nem preparált foganyagra. (Kérmás és dentin) és hagyja, hogy kb. 15 másodpercig kifejtse hatását.

– **Ezt követően** alaposan öblitse le vízzel és víz, és oldsmenettel levegővel, vagy pamut tampon használtával szilitsza meg, és ne szárítsa túl.

– **A kettővel** lezáró anyagot a veneer-preparáció.

– **Kereskedelmi forgalomban** kapható kb. 35%-os foszforos-marogélt pl. Scotchbond Universal Etchant terméket vigye fel a preparált és nem preparált foganyagra. (Kérmás és dentin) és hagyja, hogy kb. 15 másodpercig kifejtse hatását.

– **Ezt követően** alaposan öblitse le vízzel és víz, és oldsmenettel levegővel, vagy pamut tampon használtával szilitsza meg, és ne szárítsa túl.

– **A kettővel** lezáró anyagot a veneer-preparáció.

– **Kereskedelmi forgalomban** kapható kb. 35%-os foszforos-marogélt pl. Scotchbond Universal Etchant terméket vigye fel a preparált és nem preparált foganyagra. (Kérmás és dentin) és hagyja, hogy kb. 15 másodpercig kifejtse hatását.

– **Ezt követően** alaposan öblitse le vízzel és víz, és oldsmenettel levegővel, vagy pamut tampon használtával szilitsza meg, és ne szárítsa túl.

– **A kettővel** lezáró anyagot a veneer-preparáció.

– **Kereskedelmi forgalomban** kapható kb. 35%-os foszforos-marogélt pl. Scotchbond Universal Etchant termé

