

サンプルご使用の前に [塗布する量の目安]

失禁物等の刺激からの皮膚の保護に

失禁等による赤みのある傷んだ皮膚の保護、
粘着製品の剥離による皮膚損傷からの保護には、
3M™ キャピロン™ 非アルコール性皮膜をお使いください。

少量をうすく
塗り広げるのが
ポイント！

失禁部位での基本的な使い方



① 皮膚を洗浄後、水分を除きます。

② 手袋を着用し、クリームを手のひらや
指先に適量取ります。

10cm×10cmあたり約0.4g / 直径1cm程度
が目安です。

③ 便や尿が接触する範囲にクリームを
塗布します。白っぽさがなくなるまで、
やさしく塗り広げます。

ベタつきの原因となりますので、塗り過ぎに
ご注意ください。

毎回塗布する必要はありません。


下記のいずれかに該当する場合を塗り直しの目安としてください。※2

- 失禁時の微温湯洗浄 2～3回毎
- 石鹸洗浄後
- 8時間毎（勤務シフト毎）

※2 使用状況、洗浄方法、洗浄料によって異なる場合があります。

注意：健康皮膚以外には使用しないでください。

詳細は製品包装およびカタログの〈ご注意〉をご覧ください。



3M™ キャビロン™ ポリマーコーティング クリーム

化粧品

ノンワセリンで、撥水・バリア。
ポリマーコーティングで
お尻・お肌を守る保護クリームです。

撥水

ワセリンを使用せずに撥水性を実現しました。
蒸れにくい保護クリームです。

バリア

3M独自のポリマーが皮膚に密着し、便や尿などの
刺激物から皮膚を守ります。皮膜剤※1と共通の
アクリレートターポリマー（アクリレーツコポリマー）を
配合しているので、バリア機能が持続します。

※1 3M™ キャビロン™ 非アルコール性皮膜

少量 × 省回数

伸びが良く、少量で効果が発揮されるため、
一回の使用量を少なくすることができます。
また、洗い流しに強く、頻回に塗り直す必要がありません。



3M、Cavilon、キャビロンは、3M社の商標です。

HPM-695-B