

Système de traitement des  
déchirures cutanées 3M



## La solution tout indiquée pour le traitement des déchirures cutanées

Une peau fragilisée, une diminution de la sensibilité et une mobilité réduite peuvent contribuer à la formation de déchirures cutanées.

Le système de traitement des déchirures cutanées 3M constitue un moyen simple et économique de traiter ces plaies, qui peuvent s'avérer douloureuses.



### 1<sup>RE</sup> ÉTAPE : Protecteur cutané non irritant Cavilon<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup>

Le protecteur cutané non irritant Cavilon<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup> forme une barrière protectrice transparente entre la peau et les irritants qui risquent d'en causer la dégradation.

- Aide à prévenir la macération de la peau
- Exempt d'alcool; n'irrite pas la peau rouge ou dénudée
- Non cytotoxique; ne nuit pas à la cicatrisation de la peau
- Offre une excellente protection contre les traumatismes cutanés causés par le ruban adhésif

**Appliquer une couche uniforme de protecteur cutané non irritant Cavilon<sup>MC</sup> sur tout le pourtour de la plaie. Laisser sécher complètement avant d'appliquer le pansement.**



### 2<sup>RE</sup> ÉTAPE : Pansement absorbant en acrylique transparent Tegaderm<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup>

Le pansement absorbant en acrylique transparent Tegaderm<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup> offre un rendement clinique optimal et un temps de port prolongé.

- Permet une surveillance facile de la plaie, de l'exsudat et du pourtour de la plaie
- Peut être porté plus longtemps que les autres pansements de marques populaires
- Est confortable pour les patients


**Centrer le pansement absorbant en acrylique transparent Tegaderm<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup> sur la plaie. Appuyer délicatement sur le pansement pour le mettre en place. Retirer lentement le cadre tout en appuyant sur le pansement et en lissant la bordure.**

# Algorithme décisionnel relatif aux déchirures cutanées de l'ISTAP

Utilisé avec la permission de l'International Skin Tear Advisory Panel (ISTAP)



## Algorithme de traitement des déchirures cutanées de 3M



### Renseignements pour commander

#### Protecteur cutané non irritant Cavilon™ 3M™

N° de référence	Format	Articles/boîte	Boîtes/caisse
3343E	Tube-applicateur de 1,0 ml	25	4
3344E	Lingette de 1,0 ml	30	6
3345E	Tube-applicateur de 3,0 ml	25	4
3346E	Flacon pulvérisateur de 28,0 ml	12	1



Offert au Canada par la :

Division des solutions pour soins aigus et continus de 3M  
Compagnie 3M Canada

C.P. 5757  
London (Ontario)  
N6A 4T1  
1 800 364-3577  
www.3M.ca/Skinwound

3M Soins de santé

2510 Conway Avenue  
St. Paul, MN 55144-1000  
É.-U.

#### Pansement absorbant en acrylique transparent Tegaderm™ 3M™

N° de référence	Dimensions de la compresse du pansement	Dimensions globales du pansement	Pansements /boîte	Boîte /caisse
90800, ovale	3,8 x 5,7 cm 1,5 x 2,25 po	7,6 x 9,5 cm 3,0 x 3,75 po	5	6
90801, ovale	6,0 x 7,6 cm 2,4 x 3,0 po	11,1 x 12,7 cm 4,4 x 5,0 po	5	6
90802, carré	9,8 x 10,1 cm 3,9 x 4,0 po	14,9 x 15,2 cm 5,9 x 6,0 po	5	6
90803, ovale	8,5 x 10,7 cm 3,4 x 4,25 po	14,2 x 15,8 cm 5,6 x 6,25 po	5	6
90805, carré	14,9 x 15,2 cm 5,9 x 6,0 po	20,0 x 20,3 cm 7,9 x 8,0 po	5	4
90807, région sacrée	11,75 x 14,3 cm 4,5 x 5,6 po	16,8 x 19 cm 6,6 x 7,5 po	5	4