



Doeltreffende bescherming kan eenvoudig zijn.

Op intensivecareafdelingen is de belasting altijd aanzienlijk hoog. Onvoorziene omstandigheden kunnen de werksituatie nog extra bemoeilijken.

Met onze innovatieve medische hulpmiddelen kunt u het personeel op de intensivecareafdeling ondersteunen en patiënten tegen bijkomende complicaties beschermen.

3M™ Tegaderm™ CHG (Chloorhexidinegluconaat) I.V. fixatieverband Antibacterieel verband met groot voordeel voor de intensivereafdelingen

- Kathetergerelateerde infecties worden beschouwd als vermijdbare infecties. CRBSI's (kathetergerelateerde bloedbaaninfecties) leiden tot een verlengde ligduur van gemiddeld 12 dagen en 8 dagen verlengd verblijf op de intensive care*
- Vermijd kathetergerelateerde bloedbaaninfecties (60%**reductie klinisch bewezen).
- Over de basisverzorging van de centraal veneuze katheters zou men zich geen zorgen moeten maken; Tegaderm CHG met gelamineerde fixatiestrips kan tot 7 dagen lang blijven zitten.
- Internationale richtlijnen, zoals CDC adviseren, met de hoogste categorie (Ia) van bewijs, het gebruik van transparante verbanden met chloorhexidine.
- In Nederland wordt in de richtlijn van NVIC, ook een transparant fixatieverband met chloorhexidine aanbevolen

*Referentie: Blot, S. I.; et al.: Clinical and economic outcomes in critically ill patients with nosocomial catheter-related bloodstream infections. Clinical infectious diseases 41.11 (2005): 1591-1598

**Timsit J.-F., et al. Randomized controlled trial of chlorhexidine dressing and highly adhesive dressing for preventing catheter-related infections in critically ill adults. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 2012 Dec 15;186(12):1272-8. doi: 10.1164/rccm.201206-1038OC.



Gebruikstips vindt u onder:
3M™ Tegaderm™ CHG
www.3mnederland.nl/tegaderm-chg
www.3mbelgie.be/tegaderm-chg

3M™ Curosurf™ Desinfecterende poortbeschermers vereenvoudigen en verlichten het werk

- De desinfectiedoppen bevatten 70% isopropylalcohol – extra manuele desinfectie is niet meer nodig, voor zover de katheteraansluiting geen zichtbare vervuiling vertoont.
- Het gebruik van Curosurf desinfectiedoppen leidde tot een verbeterde compliance en tot een geraamde tijdsbesparing van 82,4 werkdagen per jaar.*
- Curosurf desinfectiedoppen zijn speciaal ontwikkeld om katheteraansluitpunten te desinfecteren en te beschermen.


*Cameron-Watson C. Port Protectors in clinical practice: an audit Br. J. Nurs. 2016; 25(8): S25-S31



Gebruikstips vindt u onder:
3M™ Curosurf™
www.3mbelgie.be/curosurf
www.3m.nl/curosurf

Huidbescherming: 3M™ Cavilon™ Niet-Prikkende Barrièrefilm (NSBF) en Duurzame Barrière Crème (DBC)

- Cavilon NSBF: verlengt de draagtijd van klevende verbandhulpmiddelen, ook bij sterk transpirerende patiënten. Zo bespaart u onnodige verbandwisselingen.
- Cavilon NSBF: beschermt uw huid tegen vocht en frictie bij het veelvuldig dragen van een adembeschermingsmasker.
- Cavilon DBC: beschermt de huid van de patiënt en van het verplegend personeel bij het veelvuldig dragen van handschoenen, wassen en desinfecteren



3M Belgium bvba/sprl | Health Care | Hermeslaan 7 | 1831 Diegem
3M Nederland B.V. | Health Care | Molengraaffsingel 29 | 2629 JD Delft

3M, 3M Science, Applied to Life, Cavilon, Curosurf en Tegaderm zijn gedeponeerde merken of handelsmerken van 3M. Recyclen na het gebruik a.u.b. © 3M 2020. Alle rechten voorbehouden.

Gebruikstips vindt u onder:
3M™ Cavilon™ Niet-Prikkende Barrièrefilm
www.3mbelgie.be/cavilon
www.3m.nl/cavilon