Science.
Applied to Life.™

Arbre décisionnel de choix de Thérapie par Pression Négative

Hopital

Ville

Plaie

Est-ce que le patient présente plus de 2 comorbidités cliniques ou est-ce que la plaie est complexe?

Oui → **1**

1
- Fibrine / Tissu dévitalisé / pas d'exposition osseuse ou tendineuse, fascia profonde → **Oui**
- **Et / Ou**
- Infection, abscès → **Oui**
- **Et / Ou**
- Exposition osseuse / tendineuse ou tissu fibreux → **Oui**

1a
Protocole de détersion +° biopsie + Contrôle infection si nécessaire

2
3M™ Veraflo™ Therapy

- Pansements 3M™ V.A.C. Veraflo™ – Favorise la granulation
- Pansement 3M™ V.A.C. Veraflo Cleanse Choice™ – Nettoire les plaies présentant des localisations complexes
- Pansement 3M™ V.A.C. Veraflo Cleanse Choice™ – Favorise la détersion et le retrait des exsudats fibrineux épais

3
Est-ce que la plaie est propre et prête à être refermée?

Oui → **4**

4
Fermeture définitive ou reconstruction

Reconstruction:
- Substitut dermique ou greffe cutanée

Fermeture:
- Directe / substitut dermique / Greffe cutanée

3M™ V.A.C.® Therapy

4a
Ré-évaluation hebdomadaire des paramètre de la thérapie au vu des objectifs thérapeutiques

Transition à des pansements modernes

Arrêt ou changement de la thérapie si les objectifs n'ont pas été atteints

Non → Est-ce que le patient présente plus de 2 comorbidités cliniques ou est-ce que la plaie est complexe?

Non → **1**
- Prise en charge des exsudats
- **Et / Ou**
- Stimuler le tissu de granulation

2
3M™ Veraflo™ Therapy
- Pansement V.A.C. Veraflo

3
Est-ce que la plaie est < à 18cm x 18cm et/ ou <180 ml et/ou de profondeur < à 3cm Et / ou si le patient est mobile

Oui → 3M™ Snap™ Therapy → **4**

Non → 3M™ V.A.C.® Therapy → **4**

4
Ré-évaluation hebdomadaire des paramètre de la thérapie au vu des objectifs thérapeutiques
- Réduction de la superficie de la plaie de plus de 40% en 4 semaines
- Préparation de la plaie grâce à la 3M™ V.A.C.® Therapie à une fermeture par greffe
- Arrêt ou changement de la thérapie si les objectifs n'ont aps été atteins

Non → Utiliser la Thérapie 3M™ Veraflo™ jusqu'à 2 semaines si la plaie n'est pas propre ou pour promouvoir la formation de tissu de granulation

Continuer la thérapie en cas de transition du patient de l'Hopital à la HAD

Définition d'une plaie complexe:[1]
- Plaie nécessitant une révision chirurgicale
- Plaie du pied diabétique infectée
- Plaie présentant un lit ischémique
- Plaie infectée ou présentant une invasion de biofilm extensive
- Plaie dont la cicatrisation stagne et ne progresse pas à la suite d'une Thérapie par Pression Négative traditionnelle
- Plaie qui ne se referme pas facile
- Plaie traumatique sévère
- Fasciite nécrosante
- Plaie présentant un os exposé ou une ostéite (avec ou sans défaut traumatique)

Reference: 1. Kim PJ, Attinger CE, Crist BD, *et al.* Negative pressure wound therapy with instillation: review of evidence and recommendations Wounds-> Kim_2015_Wounds (v1.0).

1 Caractéristiques: Patient et Plaie **1a** Méthodes de détersion recommandées si possibles
2 Modalités de TPN en 1ère intention **3** Thérapie de transition **4** Fermeture/ **4a** *Ré-évaluer la plaie*

Note: Des indications, contre-indications, avertissements, précautions d'emploi et informations de sécurité spécifiques existent pour ces produits et thérapies. Veuillez consulter un médecin et les instructions d'utilisation du produit avant l'application. Ce matériel est destiné aux professionnels de la santé.

© 2021 3M. All rights reserved. 3M. Tous droits réservés. 3M et les autres marques citées sont des marques et/ou des Trade Mark. Tout usage non autorisé est interdit. PRA-PM-BE-00073 (08/21). OMG155820.