

3M™ Cavilon™ film

Nepekoč zaščitni film

Opis izdelka

3M™ Cavilon™ Nepekoč zaščitni film je polimerna raztopina, ki ob nanosu na kožo tvori enakomeren film. Ob razprijitvi nastane edinstveno ne celotično, nepekoče toplo, ki se hitro suši. Nepekoč zaščitni film Cavilon pomaga zaščititi kožo pri poljšodovanju kože pred draženjem, ki je posledica stika s ali s tekočinami, tekočinami, lepilnimi trakovi, vrenji in drugimi. Izdelek je namenjen kot primarna obramba pred draženjem, ki ga povzročajo telesne tekočine. Lahko ga uporabljate odrali, otiro in celo dolgo, saj ga ne potrebuje. Izdelki so brezbarvni, transparentni, in posebej dobro prepuščajo kisla in vlag.

Sestavine: Heksametildisiloksan, izoheksan, akrilni terpolimer, polifenilmetilsiloksan

Indikacije za uporabo

Nepekoč zaščitni film Cavilon je tekočina, ki ob nanosu na zdravo ali poškodovano kožo tvori dolgoletno vodoodporno zaščito, ki deluje kot zaščitna mešična med kožo in zaščitnimi žilicami, tekočinami, lepilnimi trakovi, vrenji in drugimi. Izdelki je namenjen kot primarna obramba pred draženjem, ki ga povzročajo telesne tekočine. Lahko ga uporabljate odrali, otiro in celo dolgo, saj ga ne potrebuje. Izdelki so brezbarvni, transparentni, in posebej dobro prepuščajo kisla in vlag.

Kontraindikacije

Nepekoč zaščitni film Cavilon se ne uporablja: pri bakterijah kontaminaciji/penetraciji, pri npr. mesta, kjer se nahaja katera iz infektivne terapije in v njej polni ali delno delujoči.

Oprema

1. NEVARNOSTI ZELO VNETLJIVI!

Nepekoč zaščitni film Cavilon vsebuje heksametildisiloksan, za katerega velja, da je zelo vnetljiv.

Nepekoč zaščitni film Cavilon je zelo vnetljiv, deluje na izgorje hlapi in se popolnoma posuši na koži.

PRED UPORABO KATERE KOLI NAPRAVE, KI LAHKO ZAGOTAVLJA VIR TOPLOTE ALI VŽIGA, POČAKAJTE VSAJ 90 SEKUND, DA SE IZDELEK POSUŠI, TO OMOGOČA, DA SE TEKOČINA POSUŠI IN IZGINEJO HLAPI.

Nepekoč zaščitni film Cavilon ne uporabljajte v bližini ognja, vročine, iskri in vrenje stene razsvetlobe.

Nepekoč zaščitni film Cavilon ne uporabljajte v bližini vzhajnih virov in vrenji, ki proizvajajo toploto. Uporabljajte le v dobro prezračenih prostorih.

Penasti aplikatorji in robčki so pakirani posemno in so namenjeni za enkratno uporabo. Ponovna uporaba lahko povzroča tveganje za okužbo ali poslabšanje delovanja izdelka. Steklena posuda, ki je namenjena uporabi pri enemu bolniku, izdelka hranite izven drugega bolnika.

Previdnostni ukrepi

1. V primeru, da se pojavi rdečica ali drugi znaki razdraženosti, oziroma če rdečica in drugi znaki razdraženosti ne izzvenijo, se posvetujte z zdravnikom.

2. Izogibajte se stiku z očmi.

3. Uporaba drugih zaščitnih izdelkov, mazil, krem ali losjonov lahko znatno poslabša učinkovitost izdelka.

Navodila za uporabo

Navodila za uporabo v kirurškem okolju:

Čistite rdečico Opreto!

Kadar se nepekoč zaščitni film Cavilon uporablja v kirurškem okolju, ga je potrebno za potrditev kirurškega postopka in okolja vključiti v "Čisto postopek tveganja" ali v obdobje "čisto".

1. Pred nanosom nepekočega zaščitnega filma Cavilon mora biti koža čista in suha.

2. Penasti aplikatorji nanesajo zaščitni film v enem sloju enakomerno po celotni zaskrbljivi površini. Uporaba filma v kirurškem okolju ni dovoljena.

3. Če se zgledijo površinske poškodbe, da se zaščitni film Cavilon posuši, nato je film ponovno nanesite samo na to površino.

4. PRED UPORABO KATERE KOLI NAPRAVE, KI LAHKO ZAGOTAVLJA VIR TOPLOTE ALI VŽIGA, POČAKAJTE VSAJ 90 SEKUND, DA SE IZDELEK POSUŠI, TO OMOGOČA, DA SE TEKOČINA POSUŠI IN IZGINEJO HLAPI.

5. V primeru, da nepekoč zaščitni film Cavilon nanesete na področje kjer so kožne gube ali na področje kjer se koža dotika kože, se prepričajte, da je področje, ki se dotika kože leženo, ali s tem omogočimo filmu, da se temeljito posuši preden se vne v normalni položaj.

6. Če izdelke uporabljate za zaščito kože pred poslabšanjem lepila, pustite da se nepekoč zaščitni film Cavilon popolnoma posuši, preden ga pokrijete z obližem, trakom ali s drugimi lepilnimi produkti.

Navodila za uporabo pri intravenski terapiji:

1. Pred nanosom nepekočega zaščitnega filma Cavilon pripravite področje v skladu s protokolom ustanove. Poskrbite, da se va antiseptični pripravek za intravensko postopilo.

2. Penasti aplikatorji nanesajo enakomerno plast filma na kožo, kjer bo prekrita z lepilnim obližem in/ali napravo. Če uporabljate zaščitni obliž, ki vsebuje hlorheksidin glukonat (CHG), ne nanesajte filma na kožo, ki bo v stiku s CHG gel držalico. Uporaba filma ni priporočljiva na področju katera za intravensko terapijo.

3. Če se pri nanavljanju zgledijo kakšen del kože, dodati sloj nanesite kale, to se prvi popolnoma posuši (približno po 30 sekundah).

4. Počakajte, da se zaščitni film Cavilon popolnoma posuši, preden ga pokrijete z lepilnim obližem in/ali z napravo.

5. Ponovni nanos nepekočega zaščitnega filma Cavilon je potreben vedno, kadar zamenjate lepilni obliž in/ali napravo: zaščito je odstranjen z lepilom.

Splošna navodila za uporabo:

1. Pred nanosom nepekočega zaščitnega filma Cavilon mora biti koža čista in suha.

2. Penasti aplikatorji nanesajo zaščito film Cavilon v enem sloju, enakomerno po celotni zaskrbljivi površini. Prišlo: Konica pršila naj bo od kože oddaljena 10 do 15 centimetrov. Nanesite plastilo in analitičnega sloja filma po celotni zaskrbljivi površini.

3. Če se pri nanavljanju zgledijo kakšen del kože, dodati sloj nanesite kale, to se prvi popolnoma posuši (približno po 30 sekundah). V primeru, ko se priložijo izpostavitveni korozivni dražilci, se lahko na kožo naneso drugi sloji filma, ki se se prvi sloj popolnoma posuši.

4. V primeru, da nepekoč zaščitni film Cavilon nanesete na področje kjer so kožne gube ali na področje kjer se koža dotika kože, se prepričajte, da je področje, ki se dotika kože leženo, ali s tem omogočimo filmu, da se temeljito posuši preden se vne v normalni položaj.

5. Pri uporabi filma pod lepilnimi trakovi, obliži ali napravami:

a) počakajte, da se zaščitni film Cavilon popolnoma posuši, preden ga pokrijete z obližem ali z lepilnim produktom.

b) ponovni nanos zaščitnega filma Cavilon je potreben vedno, kadar zamenjate obliž in/ali lepilne produkte, zaščiti film je odstranjen z lepilom.

6. Če izdelke uporabljate za zaščito pred telesnimi tekočinami, lepilnimi urini, itd. in na koži ni lepilnih sredstev:

a) Ponovno nanos nepekočega zaščitnega filma Cavilon pričarajte vsaj 48h do 72 ur, oziroma odvisno od izločanja.

b) v skrajnih primerih (npr. stalna drenaža pri zelo pogostih izločanju, na LAHKO potegnitei postopki) nanos (5, vsajh 12-24 ur).

7. Če želijo, lahko po navodilih film odstranite z uporabo medicinskega odstranjevalca lepila. Očistite in posušite področje, nato pa ponovno nanesite nepekoč zaščitni film Cavilon.

8. Da preprečite neželene poškodbe, naj bo pršilo v času, ko ga ne uporabljate, pokrito z zamaškom.

Skladstveni rok uporabe/Odstranitev: Nepekoč zaščitni film Cavilon uporabljajte pri sobni temperaturi.

Za boljše rezultate shranjevalne izdelke pri sobni temperaturi.

Za rok uporabnosti glejte datume na paketi.

Prostno vas, da neva informacijo v zvezi s priročnikom 3M prijaviite pristojnemu lokalnemu organu (EU) ali lokalnemu regulativnemu organu.

Kat. je dobljen

Penasti aplikatorji so pakirani posemno, samo za enkratno uporabo in so sterilni, razen v primeru poškodbe ali odprtja.

3M je dobil, lahko po navodilih film odstranite z uporabo medicinskega odstranjevalca lepila. Očistite in posušite področje, nato pa ponovno nanesite nepekoč zaščitni film Cavilon.

8. Da preprečite neželene poškodbe, naj bo pršilo v času, ko ga ne uporabljate, pokrito z zamaškom.

Skladstveni rok uporabe/Odstranitev: Nepekoč zaščitni film Cavilon uporabljajte pri sobni temperaturi.

Za boljše rezultate shranjevalne izdelke pri sobni temperaturi.

Za rok uporabnosti glejte datume na paketi.

Prostno vas, da neva informacijo v zvezi s priročnikom 3M prijaviite pristojnemu lokalnemu organu (EU) ali lokalnemu regulativnemu organu.

Kat. je dobljen

Penasti aplikatorji so pakirani posemno, samo za enkratno uporabo in so sterilni, razen v primeru poškodbe ali odprtja.

3M je dobil, lahko po navodilih film odstranite z uporabo medicinskega odstranjevalca lepila. Očistite in posušite področje, nato pa ponovno nanesite nepekoč zaščitni film Cavilon.

8. Da preprečite neželene poškodbe, naj bo pršilo v času, ko ga ne uporabljate, pokrito z zamaškom.

Skladstveni rok uporabe/Odstranitev: Nepekoč zaščitni film Cavilon uporabljajte pri sobni temperaturi.

Za boljše rezultate shranjevalne izdelke pri sobni temperaturi.

Za rok uporabnosti glejte datume na paketi.

Prostno vas, da neva informacijo v zvezi s priročnikom 3M prijaviite pristojnemu lokalnemu organu (EU) ali lokalnemu regulativnemu organu.

Za več informacij kliknite na: HCBRegulatory.3M.com

3M je dobil, lahko po navodilih film odstranite z uporabo medicinskega odstranjevalca lepila. Očistite in posušite področje, nato pa ponovno nanesite nepekoč zaščitni film Cavilon.

8. Da preprečite neželene poškodbe, naj bo pršilo v času, ko ga ne uporabljate, pokrito z zamaškom.

Skladstveni rok uporabe/Odstranitev: Nepekoč zaščitni film Cavilon uporabljajte pri sobni temperaturi.

Za boljše rezultate shranjevalne izdelke pri sobni temperaturi.

Za rok uporabnosti glejte datume na paketi.

Prostno vas, da neva informacijo v zvezi s priročnikom 3M prijaviite pristojnemu lokalnemu organu (EU) ali lokalnemu regulativnemu organu.

Kat. je dobljen

Penasti aplikatorji so pakirani posemno, samo za enkratno uporabo in so sterilni, razen v primeru poškodbe ali odprtja.

3M je dobil, lahko po navodilih film odstranite z uporabo medicinskega odstranjevalca lepila. Očistite in posušite področje, nato pa ponovno nanesite nepekoč zaščitni film Cavilon.

8. Da preprečite neželene poškodbe, naj bo pršilo v času, ko ga ne uporabljate, pokrito z zamaškom.

Skladstveni rok uporabe/Odstranitev: Nepekoč zaščitni film Cavilon uporabljajte pri sobni temperaturi.

Za boljše rezultate shranjevalne izdelke pri sobni temperaturi.

3M™ Cavilon™

nepekoč zaščitni film

Opis izdelka

3M™ Cavilon™ Nepekoč zaščitni film je polimerna raztopina, ki ob nanosu na kožo tvori enakomeren film. Ob razprijitvi nastane edinstveno ne celotično, nepekoče toplo, ki se hitro suši. Nepekoč zaščitni film Cavilon pomaga zaščititi kožo pri poljšodovanju kože pred draženjem, ki je posledica stika s ali s tekočinami, tekočinami, lepilnimi trakovi, vrenji in drugimi. Izdelki je namenjen kot primarna obramba pred draženjem, ki ga povzročajo telesne tekočine. Lahko ga uporabljate odrali, otiro in celo dolgo, saj ga ne potrebuje. Izdelki so brezbarvni, transparentni, in posebej dobro prepuščajo kisla in vlag.

Sestavine: Heksametildisiloksan, izoheksan, akrilni terpolimer, polifenilmetilsiloksan

Indikacije za uporabo

Nepekoč zaščitni film Cavilon je tekočina, ki ob nanosu na zdravo ali poškodovano kožo tvori dolgoletno vodoodporno zaščito, ki deluje kot zaščitna mešična med kožo in zaščitnimi žilicami, tekočinami, lepilnimi trakovi, vrenji in drugimi. Izdelki je namenjen kot primarna obramba pred draženjem, ki ga povzročajo telesne tekočine. Lahko ga uporabljate odrali, otiro in celo dolgo, saj ga ne potrebuje. Izdelki so brezbarvni, transparentni, in posebej dobro prepuščajo kisla in vlag.

Kontraindikacije

Nepekoč zaščitni film Cavilon se ne uporablja: pri bakterijah kontaminaciji/penetraciji, pri npr. mesta, kjer se nahaja katera iz infektivne terapije in v njej polni ali delno delujoči.

Oprema

1. NEVARNOSTI ZELO VNETLJIVI!

Nepekoč zaščitni film Cavilon vsebuje heksametildisiloksan, za katerega velja, da je zelo vnetljiv.

Nepekoč zaščitni film Cavilon je zelo vnetljiv, deluje na izgorje hlapi in se popolnoma posuši na koži.

PRED UPORABO KATERE KOLI NAPRAVE, KI LAHKO ZAGOTAVLJA VIR TOPLOTE ALI VŽIGA, POČAKAJTE VSAJ 90 SEKUND, DA SE IZDELEK POSUŠI, TO OMOGOČA, DA SE TEKOČINA POSUŠI IN IZGINEJO HLAPI.

Nepekoč zaščitni film Cavilon ne uporabljajte v bližini ognja, vročine, iskri in vrenje stene razsvetlobe.

Nepekoč zaščitni film Cavilon ne uporabljajte v bližini vzhajnih virov in vrenji, ki proizvajajo toploto. Uporabljajte le v dobro prezračenih prostorih.

Penasti aplikatorji in robčki so pakirani posemno in so namenjeni za enkratno uporabo. Ponovna uporaba lahko povzroča tveganje za okužbo ali poslabšanje delovanja izdelka. Steklena posuda, ki je namenjena uporabi pri enemu bolniku, izdelka hranite izven drugega bolnika.

Previdnostni ukrepi

1. V primeru, da se pojavi rdečica ali drugi znaki razdraženosti, oziroma če rdečica in drugi znaki razdraženosti ne izzvenijo, se posvetujte z zdravnikom.

2. Izogibajte se stiku z očmi.

3. Uporaba drugih zaščitnih izdelkov, mazil, krem ali losjonov lahko znatno poslabša učinkovitost izdelka.

Navodila za uporabo

Navodila za uporabo v kirurškem okolju:

Čistite rdečico Opreto!

Kadar se nepekoč zaščitni film Cavilon uporablja v kirurškem okolju, ga je potrebno za potrditev kirurškega postopka in okolja vključiti v "Čisto postopek tveganja" ali v obdobje "čisto".

1. Pred nanosom nepekočega zaščitnega filma Cavilon mora biti koža čista in suha.

2. Penasti aplikatorji nanesajo zaščitni film v enem sloju enakomerno po celotni zaskrbljivi površini. Uporaba filma v kirurškem okolju ni dovoljena.

3. Če se zgledijo površinske poškodbe, da se zaščitni film Cavilon posuši, nato je film ponovno nanesite samo na to površino.

4. PRED UPORABO KATERE KOLI NAPRAVE, KI LAHKO ZAGOTAVLJA VIR TOPLOTE ALI VŽIGA, POČAKAJTE VSAJ 90 SEKUND, DA SE IZDELEK POSUŠI, TO OMOGOČA, DA SE TEKOČINA POSUŠI IN IZGINEJO HLAPI.

5. V primeru, da nepekoč zaščitni film Cavilon nanesete na področje kjer so kožne gube ali na področje kjer se koža dotika kože, se prepričajte, da je področje, ki se dotika kože leženo, ali s tem omogočimo filmu, da se temeljito posuši preden se vne v normalni položaj.

6. Če izdelke uporabljate za zaščito kože pred poslabšanjem lepila, pustite da se nepekoč zaščitni film Cavilon popolnoma posuši, preden ga pokrijete z obližem, trakom ali s drugimi lepilnimi produkti.

Navodila za uporabo pri intravenski terapiji:

1. Pred nanosom nepekočega zaščitnega filma Cavilon pripravite področje v skladu s protokolom ustanove. Poskrbite, da se va antiseptični pripravek za intravensko postopilo.

2. Penasti aplikatorji nanesajo enakomerno plast filma na kožo, kjer bo prekrita z lepilnim obližem in/ali napravo. Če uporabljate zaščitni obliž, ki vsebuje hlorheksidin glukonat (CHG), ne nanesajte filma na kožo, ki bo v stiku s CHG gel držalico. Uporaba filma ni priporočljiva na področju katera za intravensko terapijo.

3. Če se pri nanavljanju zgledijo kakšen del kože, dodati sloj nanesite kale, to se prvi popolnoma posuši (približno po 30 sekundah).

4. Počakajte, da se zaščitni film Cavilon popolnoma posuši, preden ga pokrijete z lepilnim obližem in/ali z napravo.

5. Ponovni nanos nepekočega zaščitnega filma Cavilon je potreben vedno, kadar zamenjate lepilni obliž in/ali napravo: zaščito je odstranjen z lepilom.

Splošna navodila za uporabo:

1. Pred nanosom nepekočega zaščitnega filma Cavilon mora biti koža čista in suha.

2. Penasti aplikatorji nanesajo zaščito film Cavilon v enem sloju, enakomerno po celotni zaskrbljivi površini. Prišlo: Konica pršila naj bo od kože oddaljena 10 do 15 centimetrov. Nanesite plastilo in analitičnega sloja filma po celotni zaskrbljivi površini.

3. Če se pri nanavljanju zgledijo kakšen del kože, dodati sloj nanesite kale, to se prvi popolnoma posuši (približno po 30 sekundah). V primeru, ko se priložijo izpostavitveni korozivni dražilci, se lahko na kožo naneso drugi sloji filma, ki se se prvi sloj popolnoma posuši.

4. V primeru, da nepekoč zaščitni film Cavilon nanesete na področje kjer so kožne gube ali na področje kjer se koža dotika kože, se prepričajte, da je področje, ki se dotika kože leženo, ali s tem omogočimo filmu, da se temeljito posuši preden se vne v normalni položaj.

5. Pri uporabi filma pod lepilnimi trakovi, obliži ali napravami:

a) počakajte, da se zaščitni film Cavilon popolnoma posuši, preden ga pokrijete z obližem ali z lepilnim produktom.

b) ponovni nanos zaščitnega filma Cavilon je potreben vedno, kadar zamenjate obliž in/ali lepilne produkte, zaščiti film je odstranjen z lepilom.

6. Če izdelke uporabljate za zaščito pred telesnimi tekočinami, lepilnimi urini, itd. in na koži ni lepilnih sredstev:

a) Ponovno nanos nepekočega zaščitnega filma Cavilon pričarajte vsaj 48h do 72 ur, oziroma odvisno od izločanja.

b) v skrajnih primerih (npr. stalna drenaža pri zelo pogostih izločanju, na LAHKO potegnitei postopki) nanos (5, vsajh 12-24 ur).

7. Če želijo, lahko po navodilih film odstranite z uporabo medicinskega odstranjevalca lepila. Očistite in posušite področje, nato pa ponovno nanesite nepekoč zaščitni film Cavilon.

8. Da preprečite neželene poškodbe, naj bo pršilo v času, ko ga ne uporabljate, pokrito z zamaškom.

Skladstveni rok uporabe/Odstranitev: Nepekoč zaščitni film Cavilon uporabljajte pri sobni temperaturi.

Za boljše rezultate shranjevalne izdelke pri sobni temperaturi.

Za rok uporabnosti glejte datume na paketi.

Prostno vas, da neva informacijo v zvezi s priročnikom 3M prijaviite pristojnemu lokalnemu organu (EU) ali lokalnemu regulativnemu organu.

Kat. je dobljen

Penasti aplikatorji so pakirani posemno, samo za enkratno uporabo in so sterilni, razen v primeru poškodbe ali odprtja.

3M je dobil, lahko po navodilih film odstranite z uporabo medicinskega odstranjevalca lepila. Očistite in posušite področje, nato pa ponovno nanesite nepekoč zaščitni film Cavilon.

8. Da preprečite neželene poškodbe, naj bo pršilo v času, ko ga ne uporabljate, pokrito z zamaškom.

Skladstveni rok uporabe/Odstranitev: Nepekoč zaščitni film Cavilon uporabljajte pri sobni temperaturi.

Za boljše rezultate shranjevalne izdelke pri sobni temperaturi.

Za rok uporabnosti glejte datume na paketi.

Prostno vas, da neva informacijo v zvezi s priročnikom 3M prijaviite pristojnemu lokalnemu organu (EU) ali lokalnemu regulativnemu organu.

Kat. je dobljen

Penasti aplikatorji so pakirani posemno, samo za enkratno uporabo in so sterilni, razen v primeru poškodbe ali odprtja.

3M je dobil, lahko po navodilih film odstranite z uporabo medicinskega odstranjevalca lepila. Očistite in posušite področje, nato pa ponovno nanesite nepekoč zaščitni film Cavilon.

8. Da preprečite neželene poškodbe, naj bo pršilo v času, ko ga ne uporabljate, pokrito z zamaškom.

Skladstveni rok uporabe/Odstranitev: Nepekoč zaščitni film Cavilon uporabljajte pri sobni temperaturi.

Za boljše rezultate shranjevalne izdelke pri sobni temperaturi.

Za rok uporabnosti glejte datume na paketi.

Prostno vas, da neva informacijo v zvezi s priročnikom 3M prijaviite pristojnemu lokalnemu organu (EU) ali lokalnemu regulativnemu organu.

Kat. je dobljen

Penasti aplikatorji so pakirani posemno, samo za enkratno uporabo in so sterilni, razen v primeru poškodbe ali odprtja.

3M je dobil, lahko po navodilih film odstranite z uporabo medicinskega odstranjevalca lepila. Očistite in posušite področje, nato pa ponovno nanesite nepekoč zaščitni film Cavilon.