

3M™ Avagard™

(Solución de gluconato de clorhexidina al 1 % y alcohol etílico al 61 % p/p)

Antiséptico de manos para personal quirúrgico y de atención de la salud, con humectantes

Aprobado por la FDA

*Aprobado bajo NDA 21-074, 7 de junio 2001

Instrucciones de aplicación

Para la antisepsia quirúrgica de las manos

La FDA aprobó el preparado antiséptico quirúrgico para las manos. El antiséptico quirúrgico Avagard para las manos puede usarse para el primer lavado quirúrgico y para todos los lavados quirúrgicos del día.

Aplique en manos limpias y secas.



SIN AGUA



SIN CEPILLOS

Primera aplicación del día

Limpie por debajo de las uñas con el limpiador de uñas Avagard™ de 3M™. **No hace falta frotar previamente.**



Aplicación de tres medidas dosificadas

Dosificación 1

Aplique **una medida de dosificación** (2 ml) en la palma de una de sus manos. Sumerja las puntas de los dedos de la otra mano en el antiséptico y hágalo ingresar debajo de las uñas. Esparza el antiséptico restante sobre la mano hasta llegar justo por encima del codo, cubriendo todas las superficies.



Dosificación 2

Aplique **una medida de dosificación** (2 ml) y repita el procedimiento con la otra mano.



Dosificación 3

Aplique **una última dosificación** (2 ml) del antiséptico en cualquiera de las manos y vuelva a aplicar en toda la superficie de ambas manos hasta las muñecas. Deje secar antes de ponerse los guantes. **¡No use toalla!**



Consejos que recordar

- **Utilice el producto con cuidado** en bebés prematuros o menores de 2 meses de edad. Estos productos pueden provocar irritación o quemaduras químicas.
- De acuerdo con la norma de la OSHA en relación con los patógenos de transmisión hemática, debe lavarse las manos con agua y jabón después del procedimiento quirúrgico.

¿Tiene preguntas? Llame a la línea de ayuda al cliente de 3M, al 1-800-228-3957.

ADVERTENCIAS

Inflamable, mantenga el producto alejado del fuego o las llamas. Solo para uso externo.

No utilice el producto si es alérgico al gluconato de clorhexidina o a cualquier otro ingrediente de este preparado.

Cuando utilice este producto, no se toque los ojos con las manos si ya las ha tratado con este preparado. Mantenga el producto alejado de los ojos, los oídos y la boca. Este producto puede generar lesiones oculares graves y permanentes si ingresa y permanece dentro del ojo. En caso de contacto, enjuague con agua fría inmediatamente. No utilice este producto en forma rutinaria si tiene heridas que comprometan no solo a las capas superficiales de la piel.

Suspenda el uso y consulte a un médico en caso de irritación, sensibilización o reacciones alérgicas. Pueden ser señales de una grave patología.

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, procure asistencia médica o comuníquese con algún Centro de control de intoxicaciones inmediatamente.

3M™ Avagard™

(Solución de gluconato de clorhexidina al 1 % y alcohol etílico al 61 % p/p)

Antiséptico de manos para personal quirúrgico y de atención de la salud, con humectantes

Aprobado por la FDA

*Aprobado bajo NDA 21-074, 7 de junio 2001

Instrucciones de aplicación

Para la antisepsia del personal de atención de la salud

Aplique en manos limpias y secas.



SIN AGUA

Aplicación

Aplique **una medida de dosificación** (2 ml) en la palma de una mano.



Aplique el preparado antiséptico en forma uniforme para cubrir ambas manos hasta las muñecas, prestando especial atención a los espacios entre los dedos y debajo de las uñas.



Frote las manos con el preparado antiséptico vigorosamente hasta que esté totalmente seco.



Consejos que recordar

- **Utilice el producto con cuidado** en bebés prematuros o menores de 2 meses de edad. Estos productos pueden provocar irritación o quemaduras químicas.
- ¿Tiene preguntas? Llame a la línea de ayuda al cliente de 3M, al 1-800-228-3957.

ADVERTENCIAS

Inflamable, mantenga el producto alejado del fuego o las llamas. Solo para uso externo.

No utilice el producto si es alérgico al gluconato de clorhexidina o a cualquier otro ingrediente de este preparado.

Cuando utilice este producto, no se toque los ojos con las manos si ya las ha tratado con este preparado. Mantenga el producto alejado de los ojos, los oídos y la boca. Este producto puede generar lesiones oculares graves y permanentes si ingresa y permanece dentro del ojo. En caso de contacto, enjuague con agua fría inmediatamente. No utilice este producto en forma rutinaria si tiene heridas que comprometan no solo a las capas superficiales de la piel.

Suspenda el uso y consulte a un médico en caso de irritación, sensibilización o reacciones alérgicas. Pueden ser señales de una grave patología.

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, procure asistencia médica o comuníquese con algún Centro de control de intoxicaciones inmediatamente.



División de Prevención de Infecciones
3M Health Care
2510 Conway Avenue
St. Paul, MN 55144-1000
EEUU
1-800-228-3957
www.3m.com/infectionprevention

División de Prevención de Infecciones
3M Canadá
Post Office Box 5757
London, Ontario N6A4T1
Canadá
1-800-364-3577

La forma y los colores del envase de Avagard y del soporte para pared son marcas comerciales de 3M. Avagard es una marca comercial de 3M.

Por favor, recicle. Impreso en los EEUU
© 3M 2012, 2013, 2015. Todos los derechos reservados.
70-2010-8245-3